



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA**
Facoltà di Agraria
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



CITTA' DI BARLETTA
*Assessorato Assetti del Territorio
e Sviluppo Turistico Produttivo*



Bollettino Fitosanitario n° 1 del 26/04/2011

In questa settimana, il passaggio di una debole perturbazione ha favorito un aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse.

VITE

I vigneti si trovano allo stadio fenologico di grappoli visibili e alcuni vitigni precoci hanno raggiunto lo stadio di grappoli separati.

La vite, e in particolare i grappolini sono in una fase molto sensibile alle malattie fungine. Per il momento non è stata notata nessuna infezione di peronospora e di oidio. Si suggerisce, comunque, un trattamento cautelativo di copertura con un antiperonosporico e un antioidico (MANCOZEB, METIRAM, DITHIANON, RAMEICI e ZOLFO), entro la fine di questa settimana. La pioggia registrata in questa settimana potrebbe incidere sul primo evento infettante.

OLIVO

Fase fenologica: ripresa vegetativa, mignolatura.

Presenza localizzata di **occhio di pavone**, **cocciniglia mezzo grano di pepe**.

Negli oliveti con presenza di *fumaggine*, è bene eseguire la potatura per arieggiare le piante.

Contro la *carie*, si consiglia effettuare la slupatura, e di coprire il legno scoperto con catrame o mastice.

Se invece è stata effettuata la potatura, è necessario intervenire con prodotti rameici.

