




**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA**
Facoltà di Agraria
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



CITTA' DI BARLETTA
*Assessorato Assetti del Territorio
e Sviluppo Turistico Produttivo*



Bollettino Fitosanitario n° 6 del 31/05/2011

VITE

Fase fenologica: fine fioritura, allegagione

Nei vigneti monitorati le condizioni fitosanitarie non sono variate.

In presenza di condizioni di instabilità atmosferica, rinnovare la difesa antiperonosporica intervenendo con prodotti endoterapici. Abbinare alla difesa antiperonosporica una delle seguenti sostanze attive: Spiroxamina, Metrafenone, Meptyl-dinocap, IBE (Fenbuconazole, Myclobutanil, Penconazole, Propiconazole, Tebuconazole, Tetraconazole; per controllare l'oidio.

Tignola (*Lobesia Botrana*): nei vigneti monitorati le catture sono in diminuzione.

OLIVO

Fase fenologica:. Fioritura, allegagione.

SITUAZIONE FENOLOGICA:TUAZIONE FENOLOGICA:

Presenza localizzata di occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), tignola (*Prays oleae*) (generazione antofaga).

Nessun trattamento.

