




**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA**
Facoltà di Agraria
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



CITTA' DI BARLETTA
*Assessorato Assetti del Territorio
e Sviluppo Turistico Produttivo*



Bollettino Fitosanitario n° 8 del 14/06/2011

VITE

Fase fenologica: ingrossamento acini

Le condizioni fitosanitarie rimangono invariate, all'attuale fase fenologica a elevato rischio è importante mantenere alto il livello di attenzione, pertanto, si consigliano trattamenti contro la peronospora e l'oidio con agrofarmaci citotropici e sistemici. Si segnalano, inoltre, catture di *Lobesia botrana* (tignoletta) di 2^a generazione.

OLIVO

Fase fenologica: allegagione, ingrossamento drupe

Presenza localizzata di occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*).

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): Il monitoraggio ha evidenziato, con quest'ultima settimana, un sensibile aumento delle catture.

Oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*): nei giovani impianti è consigliabile l'utilizzo di fasce di fibra disaggregata da applicare sui tronchi e sui tutori al fine di impedire la risalita dell'insetto.

Nessun trattamento.