



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA**
Facoltà di Agraria
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



CITTA' DI BARLETTA
*Assessorato Assetti del Territorio
e Sviluppo Turistico Produttivo*



Bollettino Fitosanitario n° 11 del 06/07/2011

VITE

Fase fenologica: chiusura del grappolo.

PERONOSPORA: Si segnala la sporadica presenza di sintomi su foglia, si consiglia pertanto di mantenere la copertura con prodotti rameici al fine di ridurre il rischio d'infezioni secondarie.

OIDIO: Nei campi non trattati si segnala la presenza di sintomi sul grappolo. In questa fase permane l'alto rischio di infezioni secondarie derivate dal micelio (fase epidemica). Pertanto si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con l'aggiunta di zolfo a dose massima di etichetta.

MAL DELL'ESCA: In questo periodo i sintomi in campo sono più visibili sulle varietà vigorose. Si raccomanda di segnare con nastro le piante colpite per facilitare l'individuazione dopo la vendemmia al fine di una loro estirpazione o per una potatura separata.

TIGNOLETTA: Il volo è terminato.

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento delle drupe

Nel monitoraggio settimanale è stata riscontrata una significativa riduzione delle catture della tignola (*Prays oleae*).