



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FOGGIA**
Facoltà di Agraria
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



CITTA' DI BARLETTA
*Assessorato Assetti del Territorio
e Sviluppo Turistico Produttivo*



Bollettino Fitosanitario n° 14 del 26/07/2011

VITE

Fase fenologica: inizio invaiatura.

PERONOSPORA: L'instabilità atmosferica, caratterizzata da eventi piovosi, fanno prevedere nuove infezioni secondarie che potrebbero interessare la nuova vegetazione. Si consiglia pertanto di usare prodotti rameici.

OIDIO: Si consiglia di aggiungere lo zolfo al trattamento antiperonosporico.

BOTRITE: Le condizioni per lo sviluppo della muffa grigia sono favorevoli. Si consiglia di intervenire nei vigneti con cultivar a grappolo compatto e sensibili ai marciumi con: pirimetanil, fluazinam, boscalid, fenexamid oppure ciprodinil + fludioxonil.

TIGNOLETTA: Il volo della 3° generazione, nei punti di monitoraggio, non è iniziato.

OLIVO

Fase fenologica: indurimento nocciolo.