



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
FOGGIA**  
*Facoltà di Agraria*  
*Dipartimento di Scienze Agro-ambientali,  
chimica e difesa Vegetale (DiSACD)*



**CITTA' DI BARLETTA**  
*Assessorato Assetti del Territorio  
e Sviluppo Turistico Produttivo*



**Bollettino Fitosanitario n° 25 del 12/10/2011**

## **OLIVO**

**FENOLOGIA:** Invaiatura e maturazione per le varietà precoci

Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari ed in particolare la mosca, è stata riscontrata ancora una consistente presenza dell'insetto e una presenza di nuove ovodeposizioni sopra la soglia di tolleranza del 10% di infestazione attiva (presenza di uova o larve) ad eccezione delle contrade La Maruggia e Rasciatano dove i valori di infestazione attiva non superano il 6%.

Solo agli olivicoltori delle località ove si prevede la raccolta tardiva, si consiglia l'opportunità di un tempestivo trattamento larvicida rispettando i tempi di carenza per l'inizio delle operazioni di raccolta.

Inoltre si segnalano infezioni di occhio di pavone, intervenire con prodotti rameici.

Nelle aree colpite dalla grandinata di domenica, che ha provocato danni alle piante predisponendole ad attacchi di rogna dell'olivo si consiglia un trattamento a base di rame".