



<p>CITTA' DI BARLETTA <i>Assessorato Assetti del Territorio e Sviluppo Turistico Produttivo</i></p>	
<p>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA <i>Facoltà di Agraria Dipartimento di Scienze Agro-ambientali, chimica e difesa Vegetale (DiSACD)</i></p>	

Bollettino Fitosanitario n° 1 del 24/04/2012

VITE

I vigneti si trovano allo stadio fenologico di grappoli visibili e alcuni vitigni precoci hanno raggiunto lo stadio di grappoli separati.

Per il momento non è stata notata nessuna infezione di peronospora e di oidio, ma, sono state osservate infezioni di *Botrytis cinerea* sulle foglie. Considerato il protrarsi della situazione di instabilità atmosferica e le varietà più precoci in alcune località hanno raggiunto una fase molto sensibile alla peronospora. Si suggerisce, un trattamento cautelativo di copertura con un antiperonosporico e un antioidico (MANCOZEB, METIRAM, DITHIANON o RAMEICI e ZOLFO).

OLIVO

Ripresa vegetativa, mignolatura.

Presenza localizzata di **occhio di pavone, cocciniglia mezzo grano di pepe e fumaggine**.

Negli oliveti con presenza di *fumaggine*, è bene eseguire la potatura per arieggiare le piante e contenere lo sviluppo delle avversità parassitarie presenti. Contro la *carie*, effettuare la slupatura, si consiglia di coprire il legno scoperto con catrame o mastice. Negli impianti dove è stata effettuata la potatura, si consiglia di effettuare un trattamento disinfettante dei tagli e per attacchi di occhio di pavone con prodotti rameici prima della mignolatura.