




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)



COMUNE DI BARLETTA
“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”



Bollettino Fitosanitario n° 7 del 05/06/2012

VITE

Fase fenologica: Fioritura, allegagione, grani di pepe, ingrossamento acini.

La situazione generale permane tranquilla nelle aziende viticole monitorate sul territorio comunale. Sulle foglie non sono ancora state rilevate macchie d'olio causate dall'infezione primaria di peronospora. Invece, sono stati osservati lievi attacchi di oidio nella contrada “Conca d'oro”. L'attuale fase fenologica a elevato rischio richiede di mantenere un alto il livello di attenzione. Pertanto, si consigliano trattamenti per il controllo della peronospora e dell'oidio con agrofarmaci citotropici e sistemici. Si segnalano, inoltre, catture di *Lobesia botrana* (tigioletta) di 2ª generazione.

OLIVO

Fase fenologica: Allegagione

Presenza localizzata di occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*).

Si consiglia di applicare sui tronchi o branche le barriere di resinato acrilico per ostacolare la salita degli adulti di oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*).