

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI FOGGIA ***Facoltà di Agraria*** ***Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)***	
COMUNE DI BARLETTA ***"Settore Politiche Attive di Sviluppo-Ufficio Agricoltura"***	

Bollettino Fitosanitario n° 8 del 12/06/2012

VITE

Fase fenologica: Ingrossamento acini.

I sintomi delle infezioni oidiche continuano ad essere ben evidenti su foglia e talvolta anche su grappoli. Invece non si segnalano infezioni primarie di peronospora. Pertanto, i trattamenti possono continuare con prodotti endoterrapici in combinazione a zolfo per combattere l'oidio, e a scopo preventivo, si consiglia di abbinare anche un antiperonosporico.

Tignola *(Lobesia Botrana)*: nei vigneti monitorati le catture sono in lieve aumento.

OLIVO

Fase fenologica: Ingrossamento drupe

Presenza localizzata di occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*).

Oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*): nei giovani impianti è consigliabile l'utilizzo di fasce di resinato acrilico da applicare sui tronchi e sui tutori al fine di impedire la risalita dell'insetto.

Nessun trattamento.