



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)



COMUNE DI BARLETTA
*“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”*



Bollettino Fitosanitario n° 12 del 10/07/2012

VITE

Fase fenologica: chiusura del grappolo.

PERONOSPORA: le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla malattia; rinnovare la protezione intervenendo solo dopo piogge entro 2-3 giorni con prodotti rameici.

OIDIO: Mantenere alta la guardia nei confronti dell'oidio. Con infezioni in atto è preferibile utilizzare lo zolfo in polvere (zolfo ventilato), chi intende proseguire la difesa con lo zolfo bagnabile si consiglia di impiegarlo alla dose massima di etichetta.

PIANTE COLLASSATE: in diversi vigneti si riscontrano piante collassate; questa manifestazione può essere riconducibile al colpo apoplettico del Mal Dell'Esca.

TIGNOLETTA: Il volo è terminato.

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento delle drupe.

Tignola: Il volo è esaurito