




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)



COMUNE DI BARLETTA
“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”



Bollettino Fitosanitario n° 15 del 31/07/2012

VITE

Fase fenologica: invaiatura, inizio maturazione

La situazione fitosanitaria permane buona nei vigneti del comprensorio;
Fanno naturalmente eccezione gli effetti dovuti al lungo periodo di caldo e siccità consistenti in rallentamento della crescita dei tralci e ingiallimenti fogliari.

Praticamente nulle le infezioni di peronospora, la protezione può ormai essere proseguita con i tradizionali prodotti di contatto quali Dithianon o Rame. Non si segnalano nuove infezioni di oidio. Da questa fase, nei vigneti non interessati dal fungo la protezione potrà essere continuata con prodotti a base Zolfo. Con infezioni in atto sarà invece opportuno proseguire la difesa con molecole preferenzialmente lipofile e/o transaminari quali Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Metrafenone, Quinoxifen.

TIGNOLETTA: Si segnalano sporadiche catture di *Lobesia botrana* di 3ª generazione.

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento delle drupe, indurimento del nocciolo