




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)



COMUNE DI BARLETTA
“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”



Bollettino Fitosanitario n° 16 del 07/08/2012

VITE

FASE FENOLOGICA: Invaiaitura avviata sulle varietà tardive, mentre sulle precoci è in corso la maturazione.

PERONOSPORA: La recettività del grappolo alle infezioni diminuisce con l'avanzare della fase di invaiatura e non c'è nessuna segnalazione. Proseguire ancora la difesa con prodotti di contatto (Dithianon o Rame) avendo cura di irrorare bene le femminelle, soprattutto nei vigneti a tendone.

OIDIO: Dalla fase di invaiatura in poi, si può considerare conclusa la lotta antioidica; in presenza di infezioni attive si consiglia l'uso di zolfo in polvere al fine di diminuire l'inoculo per la prossima stagione.

Tignoletta: E' in corso il volo degli adulti di terza generazione, con catture localmente molto abbondanti nella zona costiera, mentre nelle zone più interne sono segnalate solo catture sporadiche. Comunque, è opportuno intervenire con prodotti curativi (*esteri fosforici*, etc.).

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento delle drupe, indurimento del nocciolo

Le olive analizzate questa settimana mostrano assenza di infestazione. Al momento non si prevedono comunque interventi. Inoltre il caldo intenso dovrebbe ostacolare l'azione dell'insetto: temperature superiori a 32°C determinano infatti una notevole mortalità delle larve, un arresto delle attività riproduttive degli adulti e dello sviluppo delle uova.