UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI FOGGIA ***Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente***	Università di Foggia
COMUNE DI BARLETTA ***"Settore Politiche Attive di Sviluppo-Ufficio Agricoltura"***	

Bollettino Fitosanitario n° 1 del 23/04/2013

VITE

I vigneti si trovano allo stadio fenologico Foglioline distese, grappoli visibili. Considerato il protrarsi della situazione di instabilità atmosferica e le varietà più precoci (Sangiovese, Merlot) hanno raggiunto una fase molto sensibile alla peronospora *(Plasmopara viticola*). Si suggerisce, un trattamento cautelativo di copertura con un antiperonosporico e un antioidico (MANCOZEB, METIRAM, DITHIANON o RAMEICI e ZOLFO).

OLIVO

Ripresa vegetativa, mignolatura.

Presenza localizzata di occhio di pavone, cocciniglia mezzo grano di pepe e fumaggine. Dopo le precipitazioni dell'ultimo periodo, è opportuno ripristinare la copertura contro l'Occhio di Pavone (*Spilocaea oleagina*) intervenendo con un prodotto rameico o a base di Dodina alle dosi indicate in etichetta. Contro la rogna si interviene con prodotti rameici, meglio se dopo l'eventuale potatura.