




UNIVERSITA' DI FOGGIA
*Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente*



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
*“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”*



Bollettino Fitosanitario n° 3 del 06/05/2013

VITE

Fase fenologica: Infiorescenze sviluppate; fiori in fase di separazione.

Fin d'ora, non è stata notata nessuna infezione di peronospora e di oidio.

L'andamento stagionale, caratterizzato da notevole variabilità con frequenti piovachi e piogge anche a carattere temporalesco, unitamente allo sviluppo vegetativo che ha ormai raggiunto un discreto grado di suscettibilità, possono comportare un elevato rischio di infezioni peronosporiche, pertanto si consiglia di intervenire con prodotti endoterapici (es. dimetomorf, iprovalicarb, cimoxanil) in miscela con prodotti di copertura. Si consiglia l'aggiunta di zolfo.

In diversi vigneti si riscontra la presenza di erniosi con le tipiche bollosità sulla pagina superiore e un feltro grigiastro sotto la foglia. In generale contro questo acaro eriofide non bisogna intervenire, a meno che l'attacco è di tale portata da bloccare la crescita vegetativa.

OLIVO

Fase fenologica: Mignolatura.

Nessun trattamento.