




UNIVERSITA' DI FOGGIA
***Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente***



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
***“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”***



Bollettino Fitosanitario n° 4 del 13/05/2013

VITE

Fase fenologica: Bottoni fiorali separati, pre-fioritura, fioritura (Sangiovese).

In questa settimana nei vigneti monitorati sono comparse le prime macchie sporulanti di peronospora in particolare sono state notate nella contrada di San Nicola. Invece, non sono stati osservati attacchi di oidio. L'attuale fase fenologica a elevato rischio richiede di mantenere un alto livello di attenzione. Pertanto, si consigliano trattamenti per il controllo della Peronospora e dell'oidio con formulati commerciali che contengono, oltre a quelli di contatto (ditiocarbammati o rameici) dei principi attivi penetranti translaminari (Dimetomorf, Mandipropamid, Fluopicolide ecc..), addizionati con zolfo bagnabile. Si osservano in numerosi vigneti, ingiallimenti della vegetazione. Per evitare possibili fenomeni di colatura è consigliabile, prima della fase della fioritura, l'utilizzo per via radicale di prodotti a base di ferro chelato.

OLIVO

Fase fenologica: Pre-fioritura – fioritura

Nessun trattamento.