




UNIVERSITA' DI FOGGIA
***Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente***



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
***“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”***



Bollettino Fitosanitario n° 9 del 17/06/2013

VITE

Fase fenologica: prechiusura grappolo, chiusura grappolo.

Nei vigneti dove le infezioni peronosporiche sono attive e con presenza di muffa bianca, è consigliato intervenire nei prossimi giorni e comunque entro la scadenza del periodo di attività del prodotto impiegato precedentemente, con antiperonosporici endoterapici aventi anche azione eradicante in combinazione con prodotti di contatto (rameici o folpet), addizionati di un antiodico pure endoterapico. Nelle realtà dove la situazione infettiva è invece, pressoché assente o ben sotto controllo, in ragione del deciso miglioramento delle condizioni meteo previsto per il prossimo periodo, può essere sufficiente impiegare il solo prodotto di contatto addizionato di uno zolfo bagnabile a dose massima di etichetta.

Si fa presente che nella fase fenologica di prechiusura del grappolo è consigliabile un trattamento antibotritico.

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*): il volo è iniziato la settimana scorsa ed è opportuno intervenire con prodotti curativi (esteri fosforici, etc..), poiché i trattamenti ovicidi e ovolarvicidi (tebufenozide, metoxifenozide e indoxacarb) vanno eseguiti dopo 4-6 gg dall'inizio del volo.

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento drupe.

In questa settimana è stato raggiunto il picco più alto della presenza della Tignola (*Prays oleae*), quindi tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana è consigliabile intervenire con prodotti a base di Fosmet o Dimetoato.