



UNIVERSITA' DI FOGGIA
*Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente*



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
*“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”*



Bollettino Fitosanitario n° 10 del 24/06/2013

VITE

Fase fenologica: prechiusura grappolo, chiusura grappolo.

Peronospora: Si raccomanda di non abbassare la guardia e prestare la massima attenzione alla gestione fitosanitaria dei vigneti. I trattamenti devono ancora continuare con prodotti ad azione penetrante.

Oidio: Nell'ultimo periodo è stata rilevata la presenza su grappoli nei campi spia non trattati; è iniziata la fase epidemica della malattia. Pertanto, è opportuno aggiungere anche prodotti antioidici specifici con medesima persistenza dell'antiperonosporico impiegato.

Botrite: E' opportuno programmare il trattamento antibotritico specifico nei singoli vigneti sulla base del raggiungimento della fase fenologica di prechiusura grappolo. Prima del trattamento anti botritico è consigliabile eseguire una potatura verde con cimatura/sfogliatura in modo da liberare i grappoli per meglio esporli al prodotto fungicida.

Tignoletta: Prosegue il volo anche se con una lieve flessione ed è opportuno intervenire con prodotti curativi (esteri fosforici, etc.).

OLIVO

Fase fenologica: ingrossamento drupe

Si riscontra un calo dei voli della generazione carpo-faga della tignola (*Prays oleae*). Comunque l'intervento deve essere effettuato prima della fase di indurimento del nocciolo con prodotti citotropici quali dimetoato o fosmet.