




UNIVERSITA' DI FOGGIA
*Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente*



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
*“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”*



Bollettino Fitosanitario n° 14 del 22/07/2013

VITE

Fase fenologica: inizio invaiatura.

PERONOSPORA: il monitoraggio evidenzia la presenza della malattia come la settimana scorsa. Conviene, pertanto, continuare a proteggere cautelativamente la vegetazione ripetendo il trattamento allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato precedentemente.

OIDIO: è stata rilevata una presenza diffusa di infezioni di entità variabile; prosegue la fase epidemica della malattia, si consiglia di utilizzare zolfo in polvere particolarmente attivo in presenza di infezioni.

MAL DELL'ESCA: sono stati segnalati numerosi vigneti con incidenza elevata di piante con sindrome del mal dell'esca. In questi casi è indicato estirpare le piante malate o capitozzare al di sopra del punto d'innesto per contenere la diffusione della malattia.

TIGNOLETTA: il volo della 3° generazione, nei punti di monitoraggio, non è iniziato.

OLIVO

Fase fenologica: pre-indurimento nocciolo.

Nessun trattamento