



UNIVERSITA' DI FOGGIA
*Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti
e dell'Ambiente*



Università di Foggia

COMUNE DI BARLETTA
*“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”*



Bollettino Fitosanitario n 17 del 12/08/2013

VITE

Fase fenologica: Maturazione.

Peronospora (Plasmopara viticola): La difesa può considerarsi ultimata. Solo nei vigneti in cui sono presenti infezioni attive sulle femminelle, bisogna valutare l'opportunità di eseguire un ulteriore intervento con prodotti a base di rame.

Nei nuovi impianti, gli interventi dovranno invece proseguire per tutto il mese di agosto seguendo le indicazioni riportate nei disciplinari.

Oidio (Uncinula necator): La difesa antioidica può considerarsi conclusa; solo in presenza di infezioni attive, valutare l'opportunità di intervenire con zolfo. È consigliabile l'uso di zolfo in polvere, efficace anche su infezioni attive.

Tignoletta (Lobesia botrana): Si avvisa, che prosegue il III volo degli adulti di Tignoletta ed è opportuno intervenire con prodotti curativi (*esteri fosforici*, etc.), se non è stato eseguito.

OLIVO

Fase fenologica: Ingrossamento drupe.

Le catture della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) nelle trappole cromotropiche gialle, come pure le punture fertili sui frutti sono state praticamente nulle.

Nessun trattamento